

Pflichttexte / Pflichtangaben

aprigold®

1. Multi-Ballaststoff-Komplex

Nahrungsergänzungsmittel. Zutaten: Enzymatisch fermentierte Guarkernfaser (Sunfiber®), resistentes Maisdextrin (Fibersol®-2), indische Flohsamenschalen (fein vermahlen), Inavea™ (Seyal Akazienfaser, Baobab-Fruchtpulver), Inulin, Beta-Glucan aus Hafer, Calciumcitrat (Calcium), Grünkohlpulver, Apfelpektin, natürliches Apfelaroma, Spirulina Pulver. **Ballaststoffgehalt:** 10g pro Tagesportion. **Inhalt:** 420g Pulver für 30 Tagesportionen. **Verzehrempfehlung:** 2x täglich je 1 Messlöffel Pulver à 7g mit mind. 250ml Wasser zubereiten. Das Getränk ca. 30 Minuten quellen lassen und vor dem Verzehr nochmals schütteln. **Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

2. Darmkulturen-Komplex

Nahrungsergänzungsmittel. Zutaten: Resistentes Maisdextrin, pflanzliche Kapselhülle (Hydroxypropyl-methylcellulose, Methacrylat), vermehrungsfähige Lacto- und Bifidobakterien (L. rhamnosus LA13220®, L. acidophilus LA13100®, L. paracasei LA13190®, L. plantarum LA13200®, B. lactis LA13070®), Biotin. **Inhalt:** 30 Kapseln = 30 Tage. **Verzehrempfehlung:** Täglich eine Kapsel unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit verzehren. Die Einnahme sollte über mindestens 3 Monate erfolgen. **Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

butyzol®

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Ergänzende bilanzierte Diät). **Indikation:** Zum Diätmanagement bei folgenden Erkrankungen: Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom, Divertikelkrankheit. **Zutaten:** Natriumbutyrat in Mono- und Diacylglycerin-Mikroüberzug; Kapsel (Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose); Trennmittel: Reismehl, Maisdextrin. **Verzehrempfehlung:** Täglich morgens und abends je eine Kapsel unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Einnahme sollte über mindestens 3 Monate erfolgen. In Phasen eines erhöhten Bedarfs können nach Rücksprache mit dem Arzt bis zu 7 Kapseln täglich eingenommen werden. **Hinweis:** Unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. Nicht zur alleinigen Nahrungsquelle geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

direxol®

Medizinprodukt. Indikation: Reduzierung und Kontrolle von Symptomen im Zusammenhang mit Durchfallerkrankungen unterschiedlicher Ursache, wie z. B. häufig flüssiger oder weicher Stuhlgang und abdominale Beschwerden. **Kontraindikationen:** Nicht einnehmen bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. **Zusammensetzung:** 100 mg Xyloglucan (Tamarindus Indica Seed Gum, Glukose), 480 mg Gelose, Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs), Siliciumdioxid (E551), Kapsel (Hypromellose, Titandioxid). **Inhalt:** 16 Kapseln. **Dosierung:** 1-2 Kapseln alle 6-8 Stunde mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. Behandlung für 24 Stunden nach Abklingen der Symptome fortsetzen. **Wechselwirkungen:** Wie bei allen anderen pflanzlichen Produkten können auch Tamarindensamenextrakt-Verbindungen wie Xyloglucan möglicherweise mit anderen Behandlungen interagieren. Es wird empfohlen, Direxol mindestens zwei Stunden nach anderen oral verabreichten Behandlungen einzunehmen. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:** In folgenden sollte vor der Einnahme ein Arzt konsultiert werden: bei älteren Menschen, bei schweren Symptomen, bei Symptomen, die länger als 5 Tage andauern oder wenn Zweifel an der Diagnose bestehen. Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Direxol in der Schwangerschaft und Stillzeit wurde bisher nicht nachgewiesen. Daher sollte die Einnahme von Direxol bei dieser Patientengruppe nur unter der Aufsicht eines Arztes erfolgen. **Hinweis:** Es wird empfohlen, reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen und einer Ernährung zu folgen, die bei der Behandlung von Durchfall anerkannt ist. Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Hersteller:** Noventure S.L., Avenida Diagonal, 549, 5ª planta, E-08029 Barcelona, Spanien. **Vertrieb durch:** Apricot Health GmbH, Mehringdamm 57, 10961 Berlin. CE 0476

Gallenfluss-Komplex

Nahrungsergänzungsmittel. Zutaten: Taurin, Curcuma-Extrakt, pflanzliche Kapselhülle (Hydroxypropyl-methylcellulose), Cholinbitartrat, Mariendistel-Phospholipid-Formel (Mariendistel-Extrakt (Silybum marianum) und Sonnenblumenlecithin), Artischocken-Extrakt, α-Tocopherolacetat (Vitamin E), Ruhrkrautblüte (Helichrysum arenarium (L.) Moench), L-Ascorbinsäure (Vitamin C). **Inhalt:** 60 Kapseln = 30 Tage. **Verzehrempfehlung:** Täglich jeweils 1 Kapsel morgens und mittags nach einer Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit unzerkaut verzehren. Die Einnahme sollte über mindestens 3 Monate erfolgen. **Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern. Aufgrund seiner gallentreibenden Eigenschaften sollte das Produkt nicht bei einem Verschluss der Gallengänge oder einer Gallenentzündung eingenommen werden.

heposan®

Medizinprodukt. Indikation: Zur Anwendung bei anorektalen Erkrankungen wie inneren und äußeren Hämorrhoiden, Analfissuren, Proktitis und Juckreiz im Analbereich. Zur langfristigen Behandlung chronischer Beschwerden und in Fällen von Gewebeprolaps, Verstopfung, Neigung zu wiederkehrenden Beschwerden. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeitsreaktionen auf die Inhaltsstoffe. **Zusammensetzung:** Hyaluronsäure (0,2 %), Tri-Solve P (0,2 %) (Trehalose, Ceramid Ns, hydrogeniertes Lecithin), Methylsulfonylmethan, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Bisabolol, Wasser, Sorbitol, Pentylen glycol, Propylenglycol, Dinatrium-EDTA, Natrium/Calcium-Copolymer, Triclosan, Symdiol (1,2-Hexandiol, Tropolon, Caprylyl-glycol), Natriumhydroxid. Inhalt: 10 Einwegtuben à 3,5 g zur einmaligen Verwendung. **Anwendungshinweise:** Betroffene Bereiche vor der Anwendung gründlich reinigen. Zwei- oder dreimal täglich anwenden. Behandlung über 1-2 Wochen oder bis zum Abklingen der Symptome fortsetzen. Nach der Anwendung Stuhlgang für mindestens 20-30 Minuten vermeiden, damit das Produkt nicht vorzeitig entfernt wird. **Hersteller:** Alma S.r.l. – Via A. Bertani 6, 20154 Milano – Italy. **Vertrieben durch:** Apricot Health GmbH, Mehringdamm 57, 10961 Berlin. CE 1370.

heposan® interna

Nahrungsergänzungsmittel. Zutaten: Mikronisierte Bioflavonoidfraktion (Diosmin (mikronisiert), Hesperidin (mikronisiert)); Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Rosskastanienextrakt; Stabilisatoren: Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylpyrrolidon; Centella Asiatica Extrakt; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose; Nicotinamid (Niacin); Emulgator: Zuckerester von Speisefettsäuren, Farbstoff: Spirulina. **Inhalt:** 30 3-Phasen-Tabletten = 30 Tage. **Verzehrempfehlung:** 1 Tablette pro Tag, möglichst außerhalb der Mahlzeiten. Bei erhöhtem Bedarf können kurzzeitig bis zu 3 Tabletten am Tag eingenommen werden. Die Einnahme sollte über mindestens 3 Monate erfolgen. **Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Trocken, kühl und lichtgeschützt lagern.

novacalm®

Medizinprodukt. Indikation: Zur symptomatischen Behandlung von gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden bei Erwachsenen. Zur Linderung von gasbedingten Symptomen wie Völlegefühl, Blähungen, Flatulenz oder Bauchschmerzen, Regulierung der Darmpassage und der Stuhlentleerung, Normalisierung der Darmtätigkeit. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Allergien oder Unverträglichkeit gegen einzelne Inhaltsstoffe. **Zusammensetzung:** 500 mg KiOtransine®, 250 mg Simeticon, Sorbitol, Siliciumdioxid, Gummi arabicum, Xanthan, Vanillearoma, Sucralose, Acesulfame K. **Inhalt:** 30 Beutel. **Dosierung:** Maximal 3x täglich nach den Mahlzeiten oder vor dem Schlafengehen. **Hinweis:** Nicht für Säuglinge, Kinder und Jugendliche geeignet. Novacalm enthält Sorbitol, eine Quelle für Fructose. Nicht einnehmen bei Unverträglichkeit gegenüber Sorbitol oder bei Fructoseintoleranz. **Hersteller:** KitoZyme SA, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Zone 2, Rue de Milmort, 680, BE-4040 Herstal, Belgien. **Vertrieb durch:** Apricot Health GmbH, Mehringdamm 57, 10961 Berlin. CE 0297.

premigran®

Medizinprodukt. Zweckbestimmung: Zur Prophylaxe der episodischen Migräne mit und ohne Aura. **Zusammensetzung:** Wasser, Glycerol (9,10 %), Verbindung von Akazien- und Xanthangummi, Migcyanidin (Mischung aus Extrakten aus Silberweide, Kurkuma, Weinrebe, Pfefferminze und Mutterkraut), Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Zitronensäure. **Inhalt:** 15 ml, entsprechend etwa 125 Sprühstößen. **Anwendung:** Premigran wird intranasal appliziert. Die empfohlene Dosierung ist 2 Sprühstöße je Nasenloch bei 2-3-maliger Wiederholung pro Tag. **Wechselwirkungen:** Aufgrund der Zusammensetzung von Premigran sowie dessen physikalisch-mechanischer und topischer Wirkweise sind Wechselwirkungen mit Arzneimitteln unwahrscheinlich und bisher nicht bekannt. Aus grundsätzlichen Überlegungen sollten andere Produkte zur nasalen Behandlung jedoch in einem zeitlichen Abstand zur Anwendung von Premigran appliziert werden. **Unerwünschte Ereignisse und Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Kribbeln in der Nase, Naselaufen; Häufig: Niesen, Reizung der Nasenschleimhaut. **Hinweis:** Nicht anwenden bei Allergien gegen einzelne Inhaltsstoffe, Salicylate oder Korbblütler (z.B. Mutterkraut, Gänseblümchen, Löwenzahn, Kamille). Schwangere, Stillende und Kinder unter 12 Jahren sollten dieses Medizinprodukt nur nach ärztlicher Absprache verwenden, da keine ausreichenden Sicherheitsdaten vorliegen. **Hersteller:** Vitrobio SAS, Zac de Lavaur, 63500 Issoire, Frankreich. **Vertrieb durch:** Apricot Health GmbH, Mehringdamm 57, 10961 Berlin. CE

premigran® interna

Nahrungsergänzungsmittel. Zutaten: Magnesiumbisglycinat, Acetyl-L-Carnitin, pflanzliche Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Riboflavin-5-Natriumphosphat (Vitamin B2), Magnesiumoxid, Natrium-R-Lipoat, Ubiquinon-Cyclodextrin-Komplex (Gamma-Cyclodextrin, Ubiquinon (Coenzym Q10)), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Nicotinsäure (Vitamin B3), Kapselfarbstoff (Brilliant Blue), Zinkoxid, Methylcobalamin (Vitamin B12). **Inhalt:** 90 Kapseln = 30 Tage. **Verzehrempfehlung:** Täglich 3 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit verzehren. **Unsere Empfehlung:** 2 Kapseln am Morgen und 1 am Abend. **Hinweis:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Geschlossen, trocken, kühl und lichtgeschützt lagern.

Stand September 2026

Bankverbindung:
Commerzbank
IBAN: DE34 1204 0000 0132 5166 00
BIC: COBADEFFXXX

Amtsgericht:
Berlin Charlottenburg
Aktenzeichen: HRB 222229 B
Firmensitz: Berlin
UST-ID-Nr: DE335355418

Geschäftsführung:
Alexander Puschilov